

みかん防除暦					
時期		対象病虫害	薬剤名	使用基準	備考（補助防除・散布時期）
				倍数/回数/収穫前日数、使用時期	
1	中旬	・カイガラムシ ・ハダニ	・マシン油	60倍/-/ 1 ～ 3 月	
	下旬				
2	上旬				
	中旬				
	下旬				
3	上旬	・かいよう病	・ICボルドー 6 6 D ・アビオンE	60倍/-/-	マシン油との散布間隔は14日以上開けること
	中旬				
	下旬				
4	上旬	・そうか病	・デランFL	1000倍/3回/30日	デランFLは散布適期は、 ●発芽初期（新梢 1 ～ 2 mm）
	中旬	・カイガラムシ	・アプロードフロアブル	1000倍/3回/14日	
		下旬	・灰色かび		
5	上旬	・そうか病 ・アザミウマ類	・パレード15FL ・モスピラン顆粒水溶剤	2000倍/2回/7日 4000倍/3回/14日	●開花期（3 ～5分咲き）
	中旬	・灰色かび ・そうか病	・ナリアWDG （・モベントFL）	2000倍/3回/14日	●落弁期 カイガラムシ多い場合、 モベントFLの追加散布 ・昨年サビダニ多発の場合、 サンマイト水和剤の追加散布
		下旬	・黒点病 ・アザミウマ類 ・カイガラムシ	・エムダイファー水和剤 ・ダントツ水溶剤	
	6	上旬	・黒点病 ・カイガラムシ ・カミキリ虫類	・トランスフォームFL ・エクシレルSE ・ジマンダイセン水和剤	2000倍/3回/前日 5000倍/3回/前日 500倍/4回/30日
中旬					・浮皮軽減（満開後120日ごろ） ジベレリン液剤 1 ppm（5000倍）
7	上旬	・黒点病 ・アザミウマ類 ・サビダニ	・ジマンダイセン水和剤 ・コテツFL	500倍/4回/30日 4000倍/2回/前日	
	中旬				
8	上旬	・黒点病 ・アザミウマ類 ・サビダニ ・カイガラムシ	・エムダイファー水和剤 ・アグリメック乳剤 ・コルト顆粒水和剤	600倍/2回/60日 2000倍/3回/7日 3000倍/3回/前日	・カメムシ多発の場合は、 アルバリン顆粒水和剤の追加散布
	中旬				
	下旬	・カイガラムシ	・アプロードFL	1000倍/3回/14日	補助防除
9	上旬	・黒点病 ・アザミウマ類 ・サビダニ ・カイガラムシ ・カメムシ	・ジマンダイセン水和剤 ・アルバリン顆粒水和剤 ・ダニゲッターFL	500倍/4回/30日 2000倍/3回/前日 2000倍/1回/前日	
10	上旬	・黒点病	ストロビーDF	2000倍/3回/14日	
	中旬	・ミカンハダニ	マイトコーネFL	1500倍/1回/7日	ハダニ多い場合補助防除
	下旬	・カメムシ	ロディー乳剤	2000倍/4回/7日	カメムシ多発の場合
11	中旬	・貯蔵病害	・ベルコートFL ・ベンレート水和剤	2000倍/3回/前日 4000倍/4回/前日	

	除草剤使用目安	使用時期	使用回数
春	プリグロックスL	前日	5回
	サーファクタント30	—	—
	カーメックスD	雑草発生前	1 回
夏	バスタ液剤	21日前	3回
	シンバー	雑草発生前（7日前）	2回
秋	ラウンドアップ	7日前	5回